



复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】** 通用名称：复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂
英文名称：Compound Methyl Salicylate and Menthol Patches
汉语拼音：Fufang Shuiyangsuanjiazhibohechun Tiejì
- 【成份】** 本品为复方制剂，每贴含水杨酸甲酯36毫克、l-薄荷醇33毫克、维生素E12毫克、dl-樟脑7.1毫克。辅料：生橡胶，聚异丁烯，氯化松香甘油酯，马来酸松香甘油酯，聚丁烯，氧化锌，二氧化硅，二氧化钛，丙烯酸淀粉，二丁基羟基甲苯，香料。
- 【性状】** 本品为白色片状橡胶膏。
- 【作用类别】** 本品为镇痛类非处方药药品。
- 【适应症】** 用于缓解肌肉疲劳、肌肉疼痛、颈肩痛、腰痛、跌打扭伤、关节疼痛以及冻疮。
- 【规格】** 每贴6.5cm×4.2cm。
- 【用法用量】** 撕下防粘膜贴于清洁干燥的患处。每天贴用不超过4次，每次贴用不超过8小时。
- 【不良反应】** 贴药部位偶有皮疹、发红、瘙痒、肿胀、烧灼感、刺痛感、发热、干燥等不适。
- 【禁忌】** 对水杨酸酯、阿司匹林或本品过敏者禁用。
- 【注意事项】**
1. 不得用于破损皮肤或开放性创口处。
 2. 请避免眼睛，黏膜（如口、鼻等）或皮疹部位与本品接触。
 3. 用药部位如有烧灼感、瘙痒、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医生咨询。
 4. 请勿与加热垫一同使用。
 5. 如5~6日内症状未缓解以及病情加重或反复时请向医生咨询。
 6. 孕妇及哺乳期妇女、老年人应在医生指导下使用。
 7. 12岁以下儿童须在医生指导下并在成人监护下使用。
 8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
 9. 本品性状发生改变时禁止使用。
 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
 11. 如正在使用其他药品，使用本品前咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】** 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【药理作用】** 本品外用具有局部消炎、消肿及止痛作用。
- 【贮藏】** 保存在摄氏30度以下，避免阳光直射。
- 【包装】** 铝塑袋包装，10贴/盒，20贴/盒，40贴/盒。
- 【有效期】** 36个月
- 【执行标准】** 进口药品注册标准：JX20080131
- 【批准文号】** 进口药品注册证编号：H20090034（10贴/盒，20贴/盒），H20090044（40贴/盒）
- 【说明书修订日期】** 2011年8月16日
- 【生产企业】** 企业名称：久光制药株式会社
生产地址：日本国佐贺县鸟栖市田代大官町408
邮政编码：841-0017
电话号码：0081-3-5293-1720
传真号码：0081-3-5293-1724
网 址：www.hisamitsu.co.jp
如有问题可与生产企业联系

10112T-34